

## Agen Sitostatika Yang Digunakan Pada Kemoterapi Retinoblastoma

### Etoposide

Zat yang dapat menimbulkan nyeri di area sekitar insersi vena, tidak menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi dan diberikan dalam bentuk cairan infus (obat masih bersirkulasi dalam cairan tubuh sampai 5 hari).

### Carboplatin

Zat yang dapat menimbulkan nyeri di area sekitar insersi vena, tidak menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi (obat masih bersirkulasi dalam cairan tubuh sampai 4 hari).

### Vincristin

Zat yang dapat menimbulkan bulae atau kerusakan jaringan (obat masih bersirkulasi dalam cairan tubuh sampai 2 hari).



## Kemoterapi


*“Terapi medis dengan menggunakan obat-obatan anti kanker untuk membunuh sel kanker secara sistemik”*

“Obat-obatan yang digunakan termasuk ke dalam obat yang berbahaya dan disebut agen sitostatika. Pelayanan Kemoterapi pada Retinoblastoma, dapat dilakukan sebelum dan sesudah tindakan operasi”

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Jl. Cicendo No. 4 Bandung 40117  
Telp. (022) 4231280, 4231281  
Fax. (022) 4201960  
IGD (022) 4260456  
Call Center Paviliun: 0811 200 1005  
[www.cicendoeyehospital.org](http://www.cicendoeyehospital.org)

 Kesehatan Mata

 rs.matacicendo

 @rs\_matacicendo

 RS Mata Cicendo

# PELAYANAN KEMOTERAPI RETINOBLASTOMA



## Efek Samping Yang Mungkin Timbul Akibat Kemoterapi Retinoblastoma

**NYERI**

**MUAL  
MUNTAH**

**MUKOSITIS  
(SARIAWAN)**

**RAMBUT  
RONTOK**

**FATIGUE  
(LELAH)**

**BERAT BADAN  
TURUN**

## Penanganan Limbah Selama Kemoterapi

CAIRAN TUBUH PASIEN: darah, urin, feses, keringat, air mata, air liur, muntah, mengandung residu kemoterapi. **JANGAN** sentuh dengan tangan secara langsung, **SEGERA CUCI DENGAN SABUN DAN AIR MENGALIR.**

**PISAHKAN CUCIAN** minimal dua hari setelah terakhir kemoterapi diberikan, bila tidak segera dicuci tempatkan dalam plastik tertutup.

**GUNAKAN TOILET** saat buang air dan lakukan **FLUSHING** sebanyak 2 kali setelah toilet ditutup. Bila buang air di lantai kamar mandi, siram lantai dengan air dan cairan sabun atau detergen.

**BUANG DIAPERS** dalam kantong plastik tertutup.

**RESIDU OBAT KEMOTERAPI TIDAK HILANG DENGAN ALKOHOL** tapi dengan sabun dan air mengalir.

## Perawatan Efek Samping Kemoterapi Retinoblastoma

1. Bila terjadi mual muntah saat kemoterapi laporkan kepada perawat.
2. Jangan menawarkan makanan favorit saat anak merasa mual.
3. Tunggu 15-30 menit untuk memberikan kembali makanan setelah muntah.
4. Pastikan untuk berkumur atau membersihkan mulut setelah anak muntah.
5. Hindari tidur terlentang setelah makan.
6. Jauhkan makanan berbau tajam saat anak mual.
7. Untuk anak yang lebih besar coba untuk mengunyah permen karet menghisap permen es pop, atau es batu, minum jus atau minuman berasa, hindari susu kecuali ASI.
8. Saat anak mengalami sariawan, bersihkan mulut sesering mungkin.
9. Berkumur dengan air garam (setengah sendok garam larutkan dalam segelas air matang).
10. Berikan makanan dengan tekstur yang lembut atau mudah dikunyah.
11. Bila anak mengalami nyeri akibat sariawan sehingga tidak bisa makan atau minum segera konsultasi dengan dokter.
12. Hindari bepergian jauh minimal 1 minggu setelah kemoterapi, bila terpaksa harus pergi gunakan masker.